


БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫҚ ВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯЛАР КЕЗІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР



Жедел респираторлық вирустық инфекция (ЖРВИ) - жоғарғы тыныс алу жолдарының қабынуымен және қызбамен, тұмаумен, түшкірумен, жөтелмен, тамақтың ауыруымен, қарқындылығы әртүрлі жалпы жай-күйінің бұзылуымен байқалатын тыныс алу жолдарының шектелген инфекциясы.



Жедел респираторлық инфекцияны тудыратын вирустардың 300-ден астам түрі бар (тұмау вирусы, риновирус, коронавирус, респираторлық-синцитиалды вирус, адено-вирус және т. б.).

- Вирус ауа-тамшылы жолмен науқас адам түшкіргендеге, сіңбіргендеге, жөтелгенде және жай тыныс алуынан кейін ауаға түскен бөлшектерді дем алу жолымен.
- Вирус науқас адам қолмен ұстаған заттар арқылы, мысалы, ыдыс, есік тұтқасы, телефон, жеке гигиена заттар арқылы жүгізу мүмкін.

Балалардағы ЖРВИ кезіндегі негізгі ұсныстыр

Ұсныстыр

Ұсныстыр	Ұсныстырды орындаудың жақсы жақтары	×	Ұсныстырды орындаудың жағымсыз жақтары
1. Бала жағдайының ауырлығын бағалау	1. Өмірге қауіпті ауруды жіберіп алмау үшін		1. Менингит, тұмау, көкжөтел, пневмонияны дер кезінде анықталмауы мүмкін
2. Гигиенаны сақтау (қолды жікі және дұрыс жуу, тамақтан кейін ауыз қуысын шаю)	2. Инфекцияның таралуын алдын алу және жүқпалы ауруларды алдын алу үшін		2. Отбасы мүшелеріне жүгізу және ауру ұзақтығының ұзаруы
3. Ауыз су режимін міндепті түрде ұстану. Ішуге зауқы болмаған жағдайда жиі, аз бөліктемен беру. Газдалған сусын, какао, кофе, сүт коктейльдерінен, тәтті сусындар және т.б. бастарту.	3. Ағзадан вирустар мен токсингерді жылдам шығару үшін		3. Егер су режимін сақтамаса, сусыздану қаннның қоюлануы және ішкі мүшелердің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуына әкеледі
4. Бала бөлмесінің қолайлы ауа параметрлері және температурасын сақтау (температура 18-22°C, ылғалдылық 40-70%)	4. Температураны қалыпқа келтіру және ағзаның сүйіктікты жоғалтуын төмендету үшін		4. Шырышты қабықтар мен терінің құрғауы, және олардың қорғаныс функцияларының жоғалуы
5. Баланың қозғалысын шектемеу, төсек режиміне мәжбүрлемеу, жағдайы көтерсе серуендеу	5. Бұл баланың тез өзіне келуіне көмектеседі		5. Балаға ыңғайсыз жайдай тудыру
6. Бала үшін жайлы эмоциялық жағдай жасау (ұрыспау, ойын түрінде сұжәне дәрі-дәрмек беру, сипалау, құшақтау және т.б.)	6. Баланың иммунитетті артады және өзін жақсы көретіндігін сезінеді		6. Психосоматикалық аурулардың дамуына және денсаулығының нашарлауына алып келеді
7. Тәбет болмаған кезде тамақ ішуге мәжбүрлемеу!	7. Консерванттар мен бояғыштар қосылған тағам, тәттілерді шектей отырып, жасына сәйкес келетін тағамды тұтыну тез сауығуға ықпал етеді		7. Тағамның нашар қорытылуы, құсу. Тәттілерді, консерванттарды, бояғыштарды, дәмдеуіштерді тұтыну дәрі-дәрмектер мен тағам өнімдеріне аллергияның даму қаупін артырады
8. Ұңғайлы киіндіру (баланы қатты қымтамау!)	8. Температураның төмендеуіне ықпал етеді		8. Балаға ыңғайсыз жайдай тудыру
9. Мұрынмен еркін тыныс алууды қамтамасыз ету (тұз ерітінділері, мұрын бітелгенде мұрын тамшыларын тәулігіне тек 1-2 рет және 3 тәуліктен асырмай қолдану)	9. Тұз ерітінділері тұмауды жеңілдетеді. 1 жасқа дейінгі балаларға мұрын тамшыларын қолдануға болмайды.		9. Мұрын тамшыларын шектен тыс қолдану улануға әкелуі мүмкін. 5 күннен артық қолдануса мұрын шырышты қабатының атрофиясын тудырады.
10. Баланың температурасы жоғарылағанда (38 және жоғары) және жағдайы нашарлаған кезінде дene қызуын түсіретін дәрілерді қолдану (парацетамол, ибупрофен)	10. Дене қызуын түсіретін дәрілерді орынды қолдану баланың жалпы жағдайын жақсартады, бірақ тез сауығуға ықпалын тигізбейді		10. Дене қызуын түсіретін дәрілерді шектен тыс және жиі қабылдағанда бауырдың, бүйректің, сүйек кемігінің және т.б. мүшелердің зақымдану қаупі жоғарылады. Өмірге қауіпті аллергиялық реакциялар тудындауы мүмкін

Неғұрлым аныстыныш болса, соғұрлым бала тез сауығады (үрейсіз, дүрбеленсіз)

ЖРВИ ЕМДЕУДІҢ ДӘЛЕЛДЕНБЕГЕН ЖӘНЕ ҚАУІПТІ ӘДІСТЕРІ

• Антибиотиктердің қолдану

Антибиотиктер бактериялық инфекцияларды емдеу үшін ғана тиімді. Респираторлық аурулардың басым көшілігін вирустар тудырады, антибиотиктердің қолдану аурудың ұзақтығын қысқартпайды және емдемейді. Сонымен қатар, антибиотиктерді орынсыз пайдалану антибиотиктерге тәзімділіктің дамуына әкеледі. Сәбілер мен балаларда антибиотиктердің қолдану жиі аллергиялық реакциялардың дамуына септігін тигізеді.

• ЖРВИ алдын алу және емдеу мақсатында иммуномодуляторлық дәрілік заттардың қолдануға болмайды.

• Бұлы және аэрозольдық ингаляциялар қолданған дұрыс емес, себебі рандомизацияланған зерттеулерде әсері дәлелденбеген, сондай-ақ Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйімімен ЖРВИ емдеуге үйіралған. Бу ингаляцияларын күйік қаупіне байланысты балаларға қолдануға болмайды.

• Нәрестелерге мұрын тамшыларын пайдалануға болмайды, себебі бұл жағымсыз жанама әсерлерді тудыруы мүмкін, ұзақ уақыт қолданғанда мұрын қуысының шырышты қабығының атрофиясын тудырады.

Health Care Guideline Diagnosis and Treatment of Respiratory Illness in Children and Adults 2017. ICSI. Institute for Clinical Systems Improvement

МАТЕРИАЛДЫ ДАЙЫНДАҒАН:

Макалкина Л.Г., м.ғ.к., PhD, MD, "АМУ" КеАҚ клиникалық фармакология кафедрасының доценті

Ихамбаева А.Н., медицина магистры, MD, клиникалық фармаколог

Мынжанова А.М., медицина магистры, MD, дәрігер-педиатр

Оспанова А.А., MD, клиникалық фармакология кафедрасының резиденті